

EES-viðbætur

ISSN 1022-9337

Nr. 23

við Stjórnartíðindi EB

9. árgangur

2.5.2002

	I	EES-STOFNANIR	
	1.	EES-ráðið	
	2.	Sameiginlega EES-nefndin	
2002/EES/23/01		Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000 frá 26. júní 2000 um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni, nýja notkun aukefna og nýjar efnablöndur í föðri.	1
2002/EES/23/02		Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1887/2000 frá 6. september 2000 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni í föðri.	15
2002/EES/23/03		Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2437/2000 frá 3. nóvember 2000 um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni í föðri.	17
2002/EES/23/04		Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2697/2000 frá 27. nóvember 2000 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í föðri	26
2002/EES/23/05		Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/3/EB frá 8. janúar 2001 um aðlögun að tækni framförum á tilskipun ráðsins 74/150/EBE um gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum og tilskipun ráðsins 75/322/EBE um deyfingu rafsegultruflana frá hreyflum með neistakveikju í landbúnaðardráttarvélum á hjólum . . .	85
2002/EES/23/06		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum	127
2002/EES/23/07		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum	137
2002/EES/23/08		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni	154
2002/EES/23/09		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/83/EB frá 19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum	194
2002/EES/23/10		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/85/EB frá 19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni	198
2002/EES/23/11		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/72/EB frá 15. október 1998 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni	199
2002/EES/23/12		Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla	212

2002/EES/23/13	Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/49/EB frá 6. desember 1999 um niðurfellingu á ákvörðun 1999/356/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum unnum úr jarðhnetum sem eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan	226
2002/EES/23/14	Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/51/EB frá 26. júlí 2000 um breytingu á tilskipun 95/31/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir sætuefni til notkunar í matvælum	231
2002/EES/23/15	Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/63/EB frá 5. október 2000 um breytingu á tilskipun 96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni	234
2002/EES/23/16	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1565/2000 frá 18. júlí 2000 þar sem mælt er fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir vegna samþykktar matsáætlunar við beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96	295
2002/EES/23/17	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1073/2000 frá 19. maí 2000 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum	304
2002/EES/23/18	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1437/2000 frá 30. júní 2000 um breytingu á C-hluta VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum	309
2002/EES/23/19	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2020/2000 frá 25. september 2000 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 207/93 um skilgreiningu á innihaldi VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 og breytingu á C-hluta VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og ábendingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum	312
2002/EES/23/20	Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/489/EB frá 18. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB um samþykkt skráar yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum	316
2002/EES/23/21	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2364/2000 frá 25. október 2000 um fjórðu skrána yfir efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93	320
2002/EES/23/22	Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/66/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (tríasúlfúroni) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna	323
2002/EES/23/23	Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/67/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (esfenvalerati) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna	326
2002/EES/23/24	Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/68/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (bentasóni) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna	329
2002/EES/23/25	Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/171/EB frá 19. febrúar 2001 um undanþáguskilyrði fyrir glerumbúðir að því er varðar styrk þungmálma sem ákveðinn er í tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang	332
2002/EES/23/26	Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/299/EB frá 6. apríl 2000 um fyrstu flokkun á þráðlausum búnaði og endabúnaði til fjarskipta og tilheyrandi auðkenni	334
2002/EES/23/27	Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/9/EB frá 20. mars 2000 um togbrautarbúnað til fólksflutninga	336

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1353/2000

2002/EES/23/01

frá 26. júní 2000

um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni, nýja notkun aukefna og nýjar efnablöndur í föðri(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópu-banda-lagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í föðri ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 1999/20/EB ⁽²⁾, einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- Í tilskipun 70/524/EBE er kveðið á um að leyfa skuli ný aukefni eða nýja notkun aukefna með hliðsjón af framförum á sviði vísinda og tækni.
- Veita skal varanlegt leyfi fyrir efnablöndu í flokki ensíma ef öll skilyrði, sem mælt er fyrir um í a-lið 3. gr. tilskipunar 70/524/EBE, eru uppfyllt.
- Lögð voru fram gögn um varanlegt leyfi fyrir 3-fýtasann (EC 3.1.3.8), framleiddur af *Aspergillus niger* (CBS 114.94), sem lýst er í viðaukanum.
- Heimilt er að leyfa ný aukefni eða nýja notkun aukefna til bráðabirgða ef efnin, í því magni sem þau eru leyfileg í föðri, hafa hvorki skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra eða á umhverfið né skaða neytendur með því að breyta eiginleikum búfjárafurða ef unnt er að hafa stjórn á tilvist þeirra í föðri og telja má með réttu, með hliðsjón af fyrirbyggjandi niðurstöðum, að þau hafi hagstæð áhrif á eiginleika föðursins eða á búfjárframleiðslu þegar þeim er blandað í föður.
- Lögð voru fram gögn um bráðabirgðaleyfi fyrir ný ensím og örverur, nýja notkun ensíma og til að unnt sé að skipta á leyfðum efnablöndum ensíma og nýjum efnablöndum sömu ensíma.

6) Ákvæðin í tilskipun ráðsins 89/391/EBE ⁽³⁾ um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum og viðkomandi sér-tilskipunum, einkum tilskipun ráðsins 90/679/EB ⁽⁴⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/65/EB ⁽⁵⁾ um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifaalda á vinnustöðum, gilda að fullu að því er varðar starfsmenn sem meðhöndla aukefni í föðri.

7) Vísindanefndin um föður hefur sent frá sér jákvætt álit um skaðleysi þessara efnablandna ensíma og örvera og um hagstæð áhrif ensímefnablöndunnar, sem lagt er til að verði leyfð án tímamarka, á búfjárframleiðslu.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-gerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um föður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Samkvæmt tilskipun 70/524/EBE skal leyfa efnablöndurnar, sem tilheyra flokknum „ensím“ og taldar eru upp í I. viðauka við þessa reglugerð, sem aukefni í föðri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sama viðauka.

2. gr.

Í stað skilyrðanna fyrir því að leyfa efnablöndur nr. 16 og nr. 17, sem tilheyra flokknum „Ensím“, og tilgreindar eru í II. viðauka við þessa reglugerð, komi skilyrðin sem sett eru fram í sama viðauka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE.

3. gr.

Samkvæmt tilskipun 70/524/EBE skal leyfa efnablöndurnar, sem tilheyra flokknum „ensím“ og tilgreindar eru í III. viðauka við þessa reglugerð, sem aukefni í föðri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sama viðauka.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 155, 28.6.2000, bls. 15, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2001 frá 28. september 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 7.

(1) Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.

(2) Stjtið. EB L 80, 25.3.1999, bls. 20.

(3) Stjtið. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1.

(4) Stjtið. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1.

(5) Stjtið. EB L 335, 6.12.1997, bls. 17.

4. gr.

Samkvæmt tilskipun 70/524/EBE skal leyfa efnablönduna, sem tilheyrir flokknum „örverur“ og tilgreind er í IV. viðauka við þessa reglugerð, sem aukefni í föðri samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í sama viðauka.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 26. júní 2000.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

I. VIÐAUKI

EB-nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
E 1600	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Efnablanda 3-fýtasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 5 000 FTU/g ⁽¹⁾ Vökvaform: 5 000 FTU/ml	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	500 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 FTU. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,23% fýtínbundinn fosfór.	Án tímamarka
			Eldissvín	—	280 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 400-500 FTU. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,23% fýtínbundinn fosfór.	Án tímamarka
			Gyltur	—	500 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 FTU. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,36% fýtínbundinn fosfór.	Án tímamarka

EB-nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virkieiningar á kílógramm heilföðurs			
			Eldiskjúklingar	—	375 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-700 FTU. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,23% fýtínbundinn fosfór.	Án tímamarka
			Varphænur	—	250 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 300-400 FTU. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,23% fýtínbundinn fosfór.	Án tímamarka

⁽¹⁾ 1 FTU er magn þess ensims sem leysir 1 mikrómol ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,5 og 37 °C.

II. VIÐAUKI

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
16	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4	Efnablanda endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 142), með virkni að lágmarki: Fast form: 2 000 CU/g ⁽¹⁾ Vökvaform: 2 000 CU/ml	Eldiskjúklingar	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2000
			Varphænur	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2000
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2000

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
			Eldissvín	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2000
17	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: Fast form: 6 000 EPU/g ⁽²⁾ Vökvaform: 2 000 EPU/ml	Eldiskjúklingar	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs:1 500-3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2000
			Varphænur	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs:1 500-3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2000

Nr. (eða EB- nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs:1 500-3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönunum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2000
			Eldissvín	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs:1 500-3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönunum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2000

⁽¹⁾ 1 CU er magn þess ensíms sem leysir 0,128 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,5 og 30 °C.

⁽²⁾ 1 EPU er magn þess ensíms sem leysir 0,0083 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 4,7 og 30 °C.

III. VIÐAUKI

Nr. (eða EB- nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
12	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-glúkanasa, endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Trichoderma viride</i> (FERM BP-4447), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 8 000 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 18 000 U/g ⁽²⁾ Endó-1,4-beta-xýlanasi: 26 000 U/g ⁽³⁾	Eldiskalkúnar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 800 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 800 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 600 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 800–1 200 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 800-2 700 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 600-3 900 U. 3. Til nota í fôðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabinoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti og 20% bygg.	30.9.2001
17	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: Fast form: 6 000 EPU/g ⁽⁴⁾ Vökvaform: 6 000 EPU/ml	Eldiskalkúnar	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 1 500-3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabinoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti.	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
42	Endó-1,4(4)- betaxýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: Fast form: 4 000 U/g ⁽⁵⁾ Eiginleikar leyfðu efnablöndunnar: endó-1,4-beta-xýlanasi: 1,99% hveiti: 97,7% kalsíumprópíonat: 0,3% lesítín: 0,01%	Eldissvín	—	4 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 4 000 U 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% hveiti.	30.9.2001
49	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Basillólýsín EC 3.4.24.28 Fjölgalaktúronasi C 3.2.1.15	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) og fjölgalaktúronasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), með virkni að lágmarki: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U/g ⁽⁶⁾ endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U/g ⁽⁷⁾ alfa-amýlasi: 500 U/g ⁽⁸⁾ basillólýsín: 800 U/g ⁽⁹⁾ fjölgalaktúronasi: 50 U/g ⁽¹⁰⁾	Eldiskjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U Alfa-amýlasi: 500 U Basillólýsín: 800 U Fjölgalaktúr-onasi: 50 U	— — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U alfa-amýlasi: 800 U basillólýsín: 800 U fjölgalaktúronasi: 50 U 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkönnum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti.	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs			
			Varphænur	—	endó- 1,3(4)- beta- glúkanasi: 150 U endó-1,4- beta- xýlanasi: 1 500 U alfa- amýlasi: 1 000 U basillólýsín: 800 U fjölgalaktúr- onasi: 50 U	— — — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U alfa-amýlasi: 1 000 U fjölgalaktúronasi: 25 U. 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og betaglúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti.	30.9.2001
50	6-fýtasi EC 3.1.3.26	Efnablanda 6-fýtasa, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 2 500 FYT/g ⁽¹⁾ Vökvaform: 5 000 FYT/g	Eldiskjúklingar	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500-1 000 FYT 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs			
			Varphænur	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500-1 000 FYT 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001
			Eldiskalkúnar	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500-1 000 FYT 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001
			Mjólkurgrísir	2 mánuðir	500 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500-1 000 FYT 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virkniefningar á kílógramm heilföðurs			
			Eldissvín	—	500 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500-1 000 FYT 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtínbundinn fosfór.	30.9.2001
51	Endó-1,4-beta-xýlan- asi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 15136), með virkni að lágmarki: 100 IU/g ⁽¹²⁾	Eldiskjúklingar	—	10 IU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 10- IU 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2001
52	Endó-1,3(4)-beta- glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta- glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi EC 3.2.2.1	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94) og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Vökvaform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 10 000 U/m ⁽¹³⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 120 000 U/m ⁽¹⁴⁾ Alfa-amýlasi: 400 U/ml ⁽¹⁵⁾	Eldiskjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000 U Alfa-amýlasi: 40 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000-2 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000-24 000 U 3. Til nota í fôðurlöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti og 15% dúrru og 5% mais.	30.9.2001

- ⁽¹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr karboxýmetýlbeðmi við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽²⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽³⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽⁴⁾ 1 EPU er magn þess ensíms sem leysir 0,0083 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 4,7 og 30 °C.
- ⁽⁵⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,3 og 50 °C.
- ⁽⁶⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.
- ⁽⁷⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,3 og 50 °C.
- ⁽⁸⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol glúkósiðtenginga á mínútu úr vatnsóleysanlegum, víxltengdum sterkjuþjölliðum við pH 6,5 og 37°C.
- ⁽⁹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrógramm fenólsambands (týrósinjafngilda) á mínútu úr kaseíni við pH 7,5 og 40 °C.
- ⁽¹⁰⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi efniis (galaktúrónsýrujafngilda) á mínútu úr fjöl-D-galaktúrónhvarfefni við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽¹¹⁾ 1 FYT er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,5 og 37 °C.
- ⁽¹²⁾ 1 IU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birkiviði við pH 4,5 og 30 °C.
- ⁽¹³⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 7,5 og 30 °C.
- ⁽¹⁴⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr karboxýmetýlbeðmi við pH 7,5 og 30 °C.
- ⁽¹⁵⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol af glúkósa á mínútu úr víxltengdum sterkjuþjölliðum við pH 7,4 og 37 °C.
-

IV. VIÐAUKI

Nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
19	<i>Streptococcus infantarius</i> CNCM I-841 <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-840	Blanda: <i>Streptococcus infantarius</i> og <i>Lactobacillus plantarum</i> sem inniheldur að lágmarki: <i>Streptococcus infantarius</i> $0,5 \times 10^9$ CFU/g og: <i>Lactobacillus plantarum</i> 2×10^9 CFU/g	Kálfar	6 mánuðir	<i>Streptococcus infantarius</i> 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> : $0,5 \times 10^9$	<i>Streptococcus infantarius</i> 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> : $0,5 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með auk- efninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1887/2000

2002/EES/23/02

frá 6. september 2000

um bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni í fódri(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fódri ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000 ⁽²⁾, einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun 70/524/EBE er kveðið á um að heimilt sé að leyfa ný aukefni með hliðsjón af framförum á sviði vísinda og tækni.
- 2) Leyfa skal nýtt aukefni til bráðabirgða ef efnið, í því magni sem það er leyfilegt í fódri, hefur hvorki skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra eða á umhverfið né skaðar neytendur með því að breyta eiginleikum búfjárafurða ef unnt er að hafa stjórn á tilvist þess í fódri og telja má með réttu, með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum, að skilyrðið sem mælt er fyrir um í a-lið 3. gr. a í tilskipun 70/524/EBE, þ.e. virkni, hafi verið uppfyllt.
- 3) Í ljósi þeirra gagna, sem lögð voru fram í skránni og skoðuð hafa verið af aðildarríkjunum, hafa skilyrðin vegna bráðabirgðaleyfis fyrir „klínóptílólit, upprunnið úr seti“ í flokknum „bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni“ verið uppfyllt.
- 4) Einnig ætti að fella „klínóptílólit, upprunnið úr seti“ inn í áætlunina um eftirlit með því hvort díoxín sé til staðar sem mælt var fyrir um varðandi önnur aukefni í sama flokki sem þegar hafa verið leyfð. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2439/1999 ⁽³⁾, eins og henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 739/2000 ⁽⁴⁾, er kveðið á um slíka áætlun fyrir leyfð

bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni. Eftir 15. október 2000, en þann dag ættu niðurstöður eftirlitsáætlunarinnar að liggja fyrir í heild sinni, skal beita greiningarmörkunum sem mælt er fyrir um í greiningaraðferðinni fyrir díoxín ef ekki er mælt fyrir um hámarksmagn sem er byggt á grundvelli fullnægjandi gagna úr eftirlitsáætluninni varðandi það hvort díoxín sé til staðar í þessu nýja aukefni.

- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í samræmi við tilskipun 70/524/EBE er „klínóptílólit, upprunnið úr seti“ í flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni“ hér með leyft til bráðabirgða sem aukefni í fódri í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð.

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða reglugerð þessa fyrir 15. október 2000 í ljósi niðurstaðna eftirlitsáætlunarinnar varðandi það hvort díoxín sé til staðar í þessu nýja aukefni.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttagasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. september 2000.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 227, 7.9.2000, bls. 13, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2001 frá 28. september 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 155, 28.6.2000, bls. 15.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 297, 18.11.1999, bls. 8.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 87, 8.4.2000, bls. 14.

VIÐAUKI

Bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni

Nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
4	Klínóptílólit, upp- runnið úr seti	Vatnað kalsíumálsilikat, upprunnið úr seti sem inniheldur að minnsta kosti 80% klínóptílólit og mest 20% leirsteindir og er laust við trefjar og kvars Hámarksdíoxíninnihald ⁽¹⁾	Eldissvín	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001
			Eldiskjúklingar	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001
			Eldiskalkúnar	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001
			Nautgripir	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001
			Lax	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001

⁽¹⁾ Ef nákvæmt hámarksmagn hefur ekki verið ákvarðað, sé þess þörf, á grundvelli fullnægjandi gagna um tilvist díoxíns gildir hámarksmagnið 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg frá 15. október 2000.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2437/2000

2002/EES/23/03

frá 3. nóvember 2000

um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni í fódri(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fódri ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1887/2000 ⁽²⁾, einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun 70/524/EBE er kveðið á um að leyfa skuli ný aukefni eða nýja notkun aukefna með hliðsjón af framförum á sviði vísinda og tækni.
- 2) Í 9. gr. d í tilskipuninni er kveðið á um að leyfa skuli aukefni af tegund sem er skráð í II. hluta viðauka C við tilskipunina ef, að undangengnu mati á skjölunum, öll skilyrði sem mælt er fyrir um í 3. gr. a í tilskipuninni eru uppfyllt.
- 3) Í 9. gr. e í tilskipuninni er kveðið á um að heimilt sé að leyfa aukefni af sömu tegund til bráðabirgða í allt að fjögur ár ef, að undangengnu mati á skjölunum sem um getur hér að framan, skilyrði b- til e-liðar 3. gr. a í tilskipuninni hafa verið uppfyllt og ef telja má með réttu, með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum, að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-lið 3. gr. a, hafi einnig verið uppfyllt.
- 4) Matið á skjölunum, sem lögð voru fram, sýnir að örveruefnablandan, sem lýst er í I. og II. viðauka við þessa reglugerð, uppfyllir skilyrði b- til e-liðar 3. gr. a í þessari tilskipun. Enn fremur uppfyllir hún skilyrði a-liðar 3. gr. a þegar hún er notuð á mjólkurgrísi.
- 5) Einnig má telja með réttu, með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum, að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-lið 3. gr. a, séu uppfyllt hvað varðar notkun sömu örveruefnablöndu fyrir þá flokka dýra sem skráðir eru í II. viðauka við reglugerðina.
- 6) Matið á skjölunum, sem lögð voru fram, sýnir að ensímefnablöndurnar, sem lýst er í III. viðauka við þessa reglugerð, uppfylla skilyrðin fyrir bráðabirgðaleyfi sem tilgreind eru í 9. gr. e í tilskipuninni þegar

hún er notuð á þá flokka dýra og í samræmi við önnur ákvæði sem tilgreind eru í III. viðauka við þessa reglugerð.

- 7) Ákvæðin í tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum ⁽³⁾ og viðkomandi sértilskipunum, einkum tilskipun ráðsins 90/679/EBE ⁽⁴⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/65/EB ⁽⁵⁾ um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum, gilda að fullu að því er varðar starfsmenn sem meðhöndla aukefni í fódri.
- 8) Vísindanefndin um fóður hefur sent frá sér jákvætt álit um skaðleysi þessara efnablandna ensíma og örvera og um hagstæð áhrif örveruefnablöndunnar á mjólkurgrísi.
- 9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Samkvæmt tilskipun 70/524/EBE skal leyfa efnablönduna, sem tilheyrir flokknum „örverur“ og tilgreind er í I. og II. viðauka við þessa reglugerð, sem aukefni í fódri samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í sömu viðaukum.

2. gr.

Samkvæmt tilskipun 70/524/EBE skal leyfa efnablöndurnar, sem tilheyra flokknum „ensím“ og tilgreindar eru í III. viðauka við þessa reglugerð, sem aukefni í fódri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sama viðauka.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 280, 4.11.2000, bls. 28, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2001 frá 28. september 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 227, 7.9.2000, bls. 13.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB L 335, 6.12.1997, bls. 17.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 3. nóvember 2000.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

I. VIÐAUKI

EB-nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
E 1700	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (Í hlutfallinu 1/1)	Blanda <i>Bacillus licheniformis</i> og <i>Bacillus subtilis</i> með lágmarks-aukefnisinnihald $3,2 \times 10^9$ CFU/g ($1,6 \times 10^9$ CFU/g af hvorri bakteríu)	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	Án tímamarka

II. VIÐAUKI

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
20	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (Í hlutfallinu 1/1)	Blanda <i>Bacillus licheniformis</i> og <i>Bacillus subtilis</i> með lágmarks-aukefnisinnihald $3,2 \times 10^9$ CFU/g ($1,6 \times 10^9$ CFU/g af hvorri bakteríu)	Gyltur	15 daga fyrir got og á mjólkurskeiði	$0,96 \times 10^9$	$1,92 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001
			Eldissvín	—	$0,48 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001
			Eldiskjúklingar	—	$3,2 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, etópabat díklasúríl, halófúgínón, metýlbensókat/metíklórpindól, natríummónensín, nífúrsól og róbenidín	30.9.2001
			Eldiskalkúnar	—	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, etópabat díklasúríl, halófúgínón, metýlbensókat/metíklórpindól, natríummónensín, nífúrsól og róbenidín	30.9.2001

III. VIÐAUKI

Nr. (eða EB- nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
53	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), basillólýsins, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842), með virkni að lágmarki:	Mjólkur-grísir	2 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 350 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggglun	30.9.2001
	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4				Endó-1,4-beta-glúkanasi: 4 000 U	—		
	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 350 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 4 000 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 400 U/g ⁽³⁾ Basillólýsín: 450 U/g ⁽⁴⁾ Endó-1,4-beta-xýlanasi: 20 000 U/g ⁽⁵⁾	Eldis-kjúklingar	—	Alfa-amýlasi: 400 U	—	3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar að fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 25% bygg eða 20% mais.	
	Basillólýsín EC 3.4.24.28				Basillólýsín: 450 U	—		
	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8			Endó-1,4-beta-xýlanasi: 20 000 U	—	3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 45% hveiti.		

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virkniefningar á kílógramm heilföðurs			
54	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi EC 3.4.1.1 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 10 000 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 120 000 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 400 U/g ⁽³⁾ Endó-1,4-beta-xýlanasi: 210 000 U/g ⁽⁵⁾	Eldiskjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000 U Alfa-amýlasi: 40 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 21 000 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglnun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000 – 2 000 endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000 - 24 000 U alfa-amýlasi: 40 - 80 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 21 000 - 42 000 U 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum og arabinoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 45% hveiti.	30.9.2001
55	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Basillólýsín EC 3.4.24.28	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), og basillólýsíns, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 3 000 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 5 000 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 540 U/g ⁽³⁾ Basillólýsín: 450 U/g ⁽⁴⁾	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 U Alfa-amýlasi: 270 U Basillólýsín: 225 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglnun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 3 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 - 5 000 U alfa-amýlasi: 270 - 540 U basillólýsín: 225 - 450 U 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju, t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti og 15% bygg.	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs			
55 <i>(framhald)</i>			Eldissvín	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001
					Endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 U	—	2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 - 3 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 - 5 000 U alfa-amýlasi: 270 - 540 U basillólýsín: 225 - 450 U	
					Alfa-amýlasi: 270 U	—	3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju, t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	
					Basillólýsín: 225 U	—		
			Eldiskjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001
					Endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 U	—	2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 - 3 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 - 5 000 U alfa-amýlasi: 270 - 540 U basillólýsín: 225 - 450 U	
					Alfa-amýlasi: 270 U	—	3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju, t.d. þær sem innihalda yfir 50% mais eða 50% hveiti.	
					Basillólýsín: 225 U	—		

Nr. (eða EB nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virknieiningar á kílógramm heilföðurs			
55 <i>(framhald)</i>			Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymslupól og þol við köggglun.	30.9.2001
					Endó-1,4 beta-glúkanasi: 2 500 U	—	2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 500 - 3 000 U	
					Alfa-amýlasi: 270 U	—	endó-1,4-beta-glúkanasi: 2 500 - 5 000 U	
					Basillólýsín: 225 U	—	alfa-amýlasi: 270 - 540 U basillólýsín: 225 - 450 U	
							3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju, t.d. þær sem innihalda yfir 40% maís og 10% rüg.	
56	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94),	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 6 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymslupól og þol við köggglun.	30.9.2001
	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4	framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) og			Endó-1,4-beta-glúkanasi: 3 500 U	—	2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 6 000 U	
	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1	basillólýsíns, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) með virkni að lágmarki:			Alfa-amýlasi: 1 400 U	—	endó-1,4-beta-glúkanasi: 3 500 U	
	Basillólýsín: EC 3.4.24.28	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 6 000 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 3 500 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 1 400 U/g ⁽³⁾ Basillólýsín: 450 U/g ⁽⁴⁾			Basillólýsín: 450 U	—	3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönunum og beta-glúkönunum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	

Nr. (eða EB nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarksinnihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Virkniefningar á kílógramm heilföðurs			
57	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Basillólýsín EC 3.4.24.28	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) og basillólýsíns, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 3 000 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 9 000 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 540 U/g ⁽³⁾ Basillólýsín: 450 U/g ⁽⁴⁾	Eldiskjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 3 000 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 9 000 U Alfa-amýlasi: 540 U Basillólýsín: 450 U	— — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggln. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 3 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 9 000 U alfa-amýlasi: 540 U basillólýsín: 450 U 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju (einkum beðmi og hálfbeðmi, t.d. þær sem innihalda yfir 20% sólblómamjöl og 10 % sojamjöl	30.9.2001
58	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Basillólýsín EC 3.4.24.28	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> 7 (CBS 592.94), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) og basillólýsíns, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 350 U/g ⁽¹⁾ Endó-1,4-beta-glúkanasi: 5 000 U/g ⁽²⁾ Alfa-amýlasi: 400 U/g ⁽³⁾ Basillólýsín: 5 000 U/g ⁽⁴⁾	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 350 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 5 000 U Alfa-amýlasi: 400 U Basillólýsín: 5 000 U	— — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggln. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 350 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 5 000 U alfa-amýlasi: 400 U basillólýsín: 5 000 U 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkönunum og arabínoxýlönunum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg.	30.9.2001

⁽¹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr bygg við pH 7,5 og 30 °C.

⁽²⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr karboxymetylbeðmi við pH 4,8 og 50 °C.

⁽³⁾ 1 U er magn þess ensíms sem klýfur 1 mikrómol glúkósíðtenginga á mínútu með vatnsrofi úr vatnsóleysanlegum, vixlengdum sterkjufjölliðum við pH 7,5 og 37 °C.

⁽⁴⁾ 1 U er magn þess ensíms sem gerir 1 mikrógramm af asókaseíni leysanlegt í triklóredíksýru á mínútu við pH 7,5 og 37 °C.

⁽⁵⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0067 mikrómol afoxandi sykra (xylósajafngilda) á mínútu úr xylani úr birkiviði við pH 5,3 og 50 °C.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2697/2000

2002/EES/23/04

frá 27. nóvember 2000

um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í föðri(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í föðri ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1887/2000 ⁽²⁾ („tilskipuninni“), einkum 3. gr., 9. gr. e og 9. gr. i,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í 1. mgr. 9. gr. e og 1. mgr. 9. gr. i í tilskipuninni er kveðið á um að heimilt sé að veita bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni eða nýja notkun aukefnis í tiltekinn tíma.
- 2) Í 4. gr. tilskipunar ráðsins er málsmeðferð við slíka leyfisveitingu komið á.
- 3) Í 2. og 3. mgr. 9. gr. e og 1. mgr. 9. gr. i í tilskipuninni er kveðið á um að gildistími bráðabirgðaleyfanna megi ekki vera lengri en fjögur eða fimm ár eftir því hvenær bráðabirgðaleyfið var veitt í fyrsta sinn. Ef það var veitt í fyrsta sinn fyrir 1. apríl 1998 má gildistími bráðabirgðaleyfisins ekki vera lengri en fimm ár. Ef um aukefni er að ræða sem fyrst var veitt bráðabirgðaleyfi fyrir eftir 1. apríl 1998 má gildistími bráðabirgðaleyfisins ekki vera lengri en fjögur ár.
- 4) Fyrsta bráðabirgðaleyfið er veitt til 30. september sama árs eða næsta árs og það má síðan framlengja á hverju ári um eitt ár. Á síðasta ári bráðabirgðaleyfisins ætti einungis að framlengja leyfið fram að þeim degi þegar fjögur eða fimm ár (eftir því sem við á) eru liðin frá því að bráðabirgðaleyfið var fyrst veitt.

- 5) Núverandi bráðabirgðaleyfi fyrir mörgum aukefnum falla úr gildi 30. september og er því við hæfi að framlengja þessi leyfi, um eitt ár eða að þeim degi þegar fjögur eða fimm ár (eftir því sem við á) eru liðin frá því að bráðabirgðaleyfið var veitt í fyrsta sinn, í því skyni að hægt sé að leggja fram nauðsynleg gögn til þess að veita leyfi til 10 ára eða án tímamarka (en það ræðst af eðli aukefnisins sem um er að ræða).
- 6) Líta ber á framlengingu á gildistíma bráðabirgðaleyfanna sem hreina stjórnsýsluráðstöfun sem ekki felur í sér nýtt mat á aukefnunum sem um er að ræða.
- 7) Samkvæmt þessari reglugerð eru bráðabirgðaleyfin veitt í tiltekinn tíma en með fyrirvara um þann möguleika að unnt sé að afturkalla þau hvenær sem er í samræmi við ákvæði 9. gr. m og 11. gr. tilskipunarinnar. Eins og stendur eru einkum bráðabirgðaleyfi fyrir notkun sýklalyfja sem aukefna í föðri í endurskoðun í ljósi þeirrar staðreyndar að Konungsríkið Svíþjóð hefur á yfirráðasvæði sínu bannað notkun allra sýklalyfja sem aukefna í föðri á grundvelli ákvæða 11. gr. tilskipunarinnar og í ljósi álitsins sem vísindastýrininginn gaf út um þol gegn sýklalyfjum 28. maí 1999. Framkvæmdastjórnin er einnig almennt að rannsaka notkun sýklalyfja sem aukefna í föðri.
- 8) Í ljósi þeirra gagna, sem lögð voru fram og skoðuð hafa verið af aðildarríkjunum, hafa skilyrðin vegna bráðabirgðaleyfisins samkvæmt skilyrðunum sem mælt var fyrir um í viðaukanum um nýja notkun aukefnanna „tartrasín“ (E 102), „sólsetursgult FCF“ (E 110), „patentblátt V“ (E 131), og „klórófýllkóparflóki“ (E 141) sem tilheyra flokknum „litgjafar, að meðtöldum litarefnum“ verið uppfyllt.
- 9) Í ljósi þeirra gagna, sem lögð voru fram og skoðuð hafa verið af aðildarríkjunum, hafa skilyrðin vegna breytinga á eðlisástandi ensímeftablandna nr. 7 og nr. 8, sem áður hafði verið veitt bráðabirgðaleyfi fyrir, verið uppfyllt með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í viðaukanum.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 319, 16.12.2000, bls. 1, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2001 frá 28. september 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 227, 7.9.2000, bls. 13.

- 10) Bráðabirgðaleyfin fyrir örveruefnablöndu nr. 1 *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112) og nr. 4 *Bacillus cereus* (ATCC 14893), sem falla úr gildi 30. september 2000, ætti að endurnýja til bráðabirgða til 20. febrúar 2001 í því skyni að nægur tími gefist til að leggja fram viðbótarupplýsingar og til að fram geti farið endurmat á öryggi þessara tveggja stofna með tilliti til myndunar eiturefna eins og krafist er í álitni vísindanefndarinnar um föður varðandi öryggi við notkun á *Bacillus*-tegundum í föðri sem lagt var fram 17. febrúar 2000.
- 11) Framkvæmdanefndin hefur ráðfært sig við vísindanefndina um föður um öryggi þeirra ensimefnablandna sem tilgreindar eru í viðaukanum við þessa reglugerð. Nefndin lagði fram jákvætt álit í skýrslu vísindanefndarinnar um föður um notkun tiltekinna ensíma í föðri sem samþykkt var 4. júní 1998 og uppfærð 3. desember 1999.
- 12) Framkvæmdanefndin hefur ráðfært sig við vísindanefndina um föður um öryggi þeirra örveruefnablandna sem tilgreindar eru í viðaukanum við þessa reglugerð. Nefndin lagði fram jákvætt álit í skýrslunni um notkun tiltekinna örvera sem aukefna í föðri sem lögð var fram 26. september 1997 og uppfærð 27. apríl 2000.
- 13) Með það fyrir augum að gera þau læsileg og samfelld ætti að steypa öllum bráðabirgðaleyfum fyrir aukefni í föðri saman í þessari reglugerð.
- 14) Bráðabirgðaleyfin fyrir flest aukefnin falla úr gildi 30. september 2000. Nauðsynlegt er því að beita þessari reglugerð frá 1. október 2000.
- 15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um föður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Aukefnin, sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð, eru leyfð til bráðabirgða í samræmi við tilskipun ráðsins 70/524/EEB með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

Hún kemur til framkvæmda 1. október 2000.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. nóvember 2000.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

VIDAUKI

Skrá um aukefni sem tengjast einstaklingi sem er ábyrgur fyrir að setja þau í dreifingu og veitt hefur verið bráðabirgðaleyfi fyrir ekki lengur en til fimm ára

Skráningar- númer aukefnis	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
						Millígrömm virks efnis á kilógramm heilföðurs			
Sýklalyf									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avílamýsín: 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avílamýsín 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Samsetning aukefnisins: Avílamýsín: 200 g virkt efni/kg Sojaolía eða jarðefnaolía: 5 til 30 g/kg Sojabaunahýði q.s. 1 kg Avílamýsín: 100 g virkt efni/kg Sojaolía eða jarðefnaolía: 5 til 30 g/kg Sojabaunahýði q.s. 1 kg Virkt efni: Avílamýsín, C ₅₇₋₆₂ H ₈₂₋₉₀ Cl ₁₋₂ O ₃₁₋₃₂ , CAS-númer avílamýsíns A: 69787-79-7, CAS-númer avílamýsíns B: 73240-30-9 Blanda fásykra úr flokki ortósómýsína framleiddum með <i>Streptomyces viridochromogenes</i> (NRRL 2860) í kyрнаformi. Samsetning: Avílamýsín A: ≥ 60% Avílamýsín B: ≤ 18% Avílamýsín A + B: ≥ 70% Önnur avílamýsín: ≤ 6%	Kalkúnar	—	5	10	—	30.9.2001 ^(a)

Skráningar- númer aukefnis	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
						Milligrömm virks efnis á kilógramm heilföðurs			
Hníslaðlyf og önnur lyf									
26	Intervet International bv	Salínómýsinnatrium 120 g/kg (Sacox 120)	Samsetning aukefnisins: Salínómýsinnatrium = 120 g/kg Kísildíoxíð 10 til 100 g/kg Kalsíumkarbónat 350 til 700 g/kg Virkt efni: Salínómýsinnatrium, C ₄₂ H ₆₉ O ₁₁ Na, CAS-númer: 53003-10-4, natriumsalt pólýetramónó- karboxýlsýru sem er framleidd með gerjun <i>Streptomyces albus</i> (DSM 12217) Skyld óhreinindi: < 42 mg elaiófýlin/kg af salínómýsinnatrium < 40 g 17-epí-20-desoxý- salínómýsín/kg af salínómýsinnatrium	Eldiskáninur	—	20	25	Notkun bönnuð í a.m.k. fimm daga fyrir slátrun. Í notkunarleið- beiningum komi fram: „Hættulegt dýrum af hestaætt.“ „Þetta fôður inniheldur jónófór: óráðlegt er að nota það samtímis tilteknum lyfjum (t.d. tíamúlíni).“	20.3.2001 ^(b)
				Kjúklingar aldir sem verðandi varphænur	12 vikur	30	50	Í notkunarleið- beiningum komi fram: „Hættulegt dýrum af hestaætt.“ „Þetta fôður inniheldur jónófór: óráðlegt er að nota það samtímis tilteknum lyfjum (t.d. tíamúlíni).“	30.9.2001 ^(c)

Skráningar- númer aukefnis	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
						Milligrömm virks efnis á kílógramm heilföðurs			
27	Janssen Animal Health BVBA	Díklasúríl 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5% Premix)	Samsetning aukefnis:	Kalkúnar	12 vikur	1	1	Notkun bönnuð í a.m.k. fimm daga fyrir slátrun.	20.3.2001 ^(b)
			Díklasúríl: 0,5 g/100 g Sojamjöl: 99,25 g/100 g Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g Natríumhýdroxíð: 0,0538 g/100 g	Kjúklingar aldir sem verðandi varphænur	16 vikur	1	1	—	30.9.2001 ^(a)
		Díklasúríl 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% Premix)	Díklasúríl: 0,2 g/100 g Sojamjöl: 39,7 g/100 g Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g Natríumhýdroxíð: 0,0215 g/100 g Hveitiföðurmjöl: 60 g/100 g Virkt efni: Díklasúríl, C ₁₇ H ₉ C ₁₃ N ₄ O ₂ , (±)-4-klórfenýl[2,6- díklór-4-(2,3,4,5-tetrahydró- 3,5-díoxó-1,2,4-tríasín- 2-ýl)fenýl]asetónnítíl CAS-númer: 101831-37-2 Skyld óhreinindi: Niðurbrotsefnasamband (R064318): ≤ 0,2% Önnur skyld óhreinindi (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5% hvert um sig Heildaróhreinindi: ≤ 1,5%						

Skráningar- númer aukefnis	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
						Milligrömm virks efnis á kilógramm heilföðurs			
28	Alpharma AS	Alfa-madúramísín- ammoníum 1 g/100 g (Cygro 1%)	Samsetning aukefnis : Alfa-madúramísínammoníum : 1 g/100 g Bensýlalkóhól: 5 g/100 g Grófmalað maískorn: qs 100 g Virkt efni: Alfa-madúramísínammoníum C ₄₇ H ₈₃ O ₁₇ N, CAS-númer: 84878-61-5, ammoníumsalt pólýetramónó- karboxýlsýru sem framleidd er með <i>Actinomadura yumaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515). Skyld óhreinindi: Beta-madúramísínammoníum : < 10%	Kalkúnar	16 vikur	5	5	Notkun bönnuð í a.m.k. fimm daga fyrir slátrun. Í notkunarleið- beiningum komi fram: „Hættulegt dýrum af hestaætt.“ „Þetta fôður inniheldur jónófór: óráðlegt er að nota það samtímis tilteknum lyfjum (t.d. tíamúlíni).“	30.9.2001 (°)

**Skrá um önnur aukefni sem veitt hefur verið bráðabirgðaleyfi fyrir í mesta lagi til fjögurra eða til fimm ára þegar um er að ræða aukefni sem leyft hefur verið til bráðabirgða fyrir
1. apríl 1998**

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			

Litgjafar, að meðtöldum litarefnum

1. Karótenóíð og xanófýll

E 160a	Beta-karótín	C ₄₀ H ₅₆	Kanarífuglar	—	—	—	—	30.9.2001 (^d)
E 161g	Kantaxantín	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Búr- og skrautfuglar	—	—	—	—	30.9.2001 (^d)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
12	Astaxantín-auðugur <i>Phaffia rhodozyma</i> (ATCC 74219)	Hreinn lífmassi gersveppsins <i>Phaffia rhodozyma</i> (ATCC 74219), óvirkur, sem inniheldur a.m.k. 4,0 g astaxantín á hvert kílógramm aukefnis og með hámarksinnihald etoxýkvíns sem er 2 000 mg/kg.	Lax	—	—	100	Hámarksinnihaldið er gefið upp sem astaxantín. Notkun aðeins heimil frá sex mánaða aldri. Blöndun aukefnisins með kantaxantíni er heimil að því tilskildu að heildarstyrkur astaxantíns og kantaxantíns fari ekki yfir 100 mg/kg í heilföðrinu. Innihald etoxýkvíns sem gefa skal upp.	30.9.2001 ^(d)
			Silungur	—	—	100	Hámarksinnihaldið er gefið upp sem astaxantín. Notkun aðeins heimil frá sex mánaða aldri. Blöndun aukefnisins með kantaxantíni er heimil að því tilskildu að heildarstyrkur astaxantíns og kantaxantíns fari ekki yfir 100 mg/kg í heilföðrinu. Innihald etoxýkvíns sem gefa skal upp.	30.9.2001 ^(d)

2. Aðrir litgjafar:

E 102	Tartrasín	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Skrautfuglar sem eru kornætur	—	—	150	—	30.9.2001
			Lítill nagdýr	—	—	150	—	30.9.2001
E 110	Sólsetursgult FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Skrautfuglar sem eru kornætur	—	—	150	—	30.9.2001
			Lítill nagdýr	—	—	150	—	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
E 131	Patentblátt V	Kalsíumsalt dísfónsýru m-hýdroxýtetraetýldíamínó-trífenýlkarbínólanhýdríðs	Skrautfuglar sem borða korn	—	—	150	—	30.9.2001
			Lítill nagdýr	—	—	150	—	30.9.2001
E 141	Klórofýll-koparflóki	—	Skrautfuglar sem borða korn	—	—	150	—	30.9.2001
			Lítill nagdýr	—	—	150	—	30.9.2001

Nr. (eða EB-nr.)	Frumefni	Aukefni	Efnaformúla	Hámarksinnihald frumefnisins í mg/kg heilföðurs	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
---------------------	----------	---------	-------------	---	--------------	-------------------

Snefilefni

E 4	Kopar (Cu)	Koparlýsínsúlfat	$\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2)_2\cdot\text{SO}_4$	Eldissvín: — í aðildarríkjum þar sem meðalþéttleiki svína er 175 dýr eða þar yfir á hverja 100 hektara lands sem er nýtt til landbúnaðar: — í allt að 16 vikur: 175 (alls) — í aðildarríkjum þar sem meðalþéttleiki svína er minni en 175 dýr á hverja 100 hektara lands sem er nýtt til landbúnaðar: — í allt að 16 vikur: 175 (alls)	Mest 50 mg/kg af kopar í heilföðri mega koma frá koparlýsínsúlfati.	30.9.2001 (°)
				Eldissvín: — í aðildarríkjum þar sem meðalþéttleiki svína er 175 dýr eða þar yfir á hverja 100 hektara lands sem er nýtt til landbúnaðar: — frá 17. viku fram til slátrunar: 35 (alls) — í aðildarríkjum þar sem meðalþéttleiki svína er minni en 175 dýr á hverja 100 hektara lands sem er nýtt til landbúnaðar: — frá 17. viku til allt að sex mánuðum: 100 (alls) — yfir sex mánuðir fram til slátrunar: 35 (alls) Undanelldissvín: 35 (alls) Aðrar tegundir eða flokkar dýra, að undanskildum kálfum áður en jórtur hefst og sauðfé: 35 (alls)	Mest 25 mg/kg af kopar í heilföðri mega koma frá koparlýsínsúlfati.	30.9.2001 (°)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
Bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni								
3	Klínóptílólit úr gos-myndunum	Kalsíumhýdróálsilikat úr gosmynd-unum sem inniheldur minnst 85% klínóptílólit og mest 15% feldspat, glimmer og leir og er laust við trefjar og kvars. Hámarksblýinnihald: 80 mg/kg	Svín	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(f)
			Kanínur	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(f)
			Alifuglar	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(f)
4	Klínóptílólit upprunnið úr seti	Vatnað kalsíumálsilikat upprunnið úr seti sem inniheldur að minnsta kosti 80% klínóptílólit og mest 20% leirsteindir og er laust við trefjar og kvars. Hámarksdíoxíninnihald ⁽¹⁾	Eldissvín	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(o)
			Eldis-kjúklingar	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(o)
			Eldiskalkúnar	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(o)
			Nautgripir	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(o)
			Lax	—	—	20 000	Allt föður	30.9.2001 ^(o)
Ensím								
1	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Efnablanda 3-fýtasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94), með fýtasavirkni að lágmarki 5 000 FTU ⁽²⁾ /g fyrir efnablöndur í föstu og fljótandi formi	Kalkúnar	—	125 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 200 til 800 FTU. 3. Til nota í föðurlöndur með 0,3% lágmarksinnihald af fýtati, t.d. 20% hveiti.	30.9.2001 ^(d)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
2	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Efnablanda 3-fýtasa, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 289), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 2 500 FYT (³)/g Vökvaform: 5 000 FYT/g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	250 FYT	1 000 FYT	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 FYT. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 40% korn (maís, bygg, hafra, hveiti, rúg, rúghveiti), olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 ^(g)
			Eldissvín	—	400 FYT	1 000 FYT	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 FYT. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 40% korn (maís, bygg, hafra, hveiti, rúg, rúghveiti), olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 ^(g)
			Eldis-kjúklingar	—	200 FYT	1 000 FYT	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 FYT. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 40% korn (maís, bygg, hafra, hveiti, rúg, rúghveiti), olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Varphænur	—	500 FYT	1 000 FYT	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 750 FYT. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 40% korn (maís, bygg, hafra, hveiti, rúg, rúghveiti), olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 ^(b)
3	Alfa-galaktósíðasi EC 3.2.1.22	Efnablanda alfa-galaktósíðasa, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 286), með virkni að lágmarki: Vökvaform: 1 000 GALU ⁽⁴⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	300 GALU	1 000 GALU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 450 GALU. 3. Til nota í fäsykruauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 25% sojamjöl, baðmullarfrækökur og ertur.	30.9.2001 ^(e)
4	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 50 FBG ⁽⁵⁾ /g Vökvaform: 120 FBG/g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	25 FBG	40 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 25 FBG. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% maís eða bygg.	30.9.2001 ^(e)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Eldis- kjúklingar	—	10 FBG	100 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 20 FBG. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% maís.	30.9.2001 ^(m)
5	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 1 000 FXU ⁽⁶⁾ /g Vökvaform: 650 FXU/ml	Eldis- kjúklingar	—	80 FXU	200 FXU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 150 FXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ⁽⁶⁾
			Eldiskalkúnar	—	225 FXU	600 FXU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 225 til 600 FXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ⁽⁶⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	200 FXU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 200 FXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ^(g)
6	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddir með <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 800 FXU ⁽⁷⁾ /g 75 FBG ⁽⁸⁾ /g Örkornað form: 800 FXU/g 75 FBG/g Vökvaform: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Eldis- kjúklingar	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 400 FXU 38 FBG. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg og/eða hafra og hveiti.	30.9.2001 ^(g)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 400 FXU 38 FBG. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg og/eða hafra og hveiti.	30.9.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Eldissvín	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Í skilyrðunum um notkun aukefnisins og forblöndunnar skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 400 FXU 38 FBG. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg og/eða hafra og hveiti.	30.9.2001 ⁽¹⁾
7	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddir með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 36 000 FXU ⁽⁹⁾ /g 15 000 BGU ⁽¹⁰⁾ /g Vökvaform: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g Fast form: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Eldis- kjúklingar	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 3 600 til 6 000 FXU 1 500 til 2 500 BGU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% bygg og 20% hveiti.	30.9.2001 ^(8*)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 30% bygg.	30.9.2001 ^(m)
			Eldiskalkúnar	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 6 000 til 12 000 FXU 2 500 til 5 000 BGU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönun og arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2001 ^(m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Varphænur	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 12 000 FXU 5 000 BGU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínóxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti, 10% bygg og 20% sólfiðla.	30.9.2001 ^(m)
8	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-glúk-anasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 10 000 BGU ⁽¹⁰⁾ /g 4 000 FXU ⁽⁹⁾ /g Vökvaform: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g Fast form: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Eldis-kjúklingar	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 3 000 til 10 000 BGU 1 200 til 4 000 FXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum og arabínóxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% bygg.	30.9.2001 ^(g^a)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 3 000 til 5 000 BGU 1 200 til 2 000 FXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg.	30.9.2001 ^(h*)
			Varphænur	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 5 000 BGU 2 000 FXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% bygg.	30.9.2001 ^(m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
9	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95), með virkni að lágmarki: Fast form: 28 000 EXU ⁽¹¹⁾ /g Vökvaform: 14 000 EXU/ml	Eldis-kjúklingar	—	1 400 EXU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 400 EXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ⁽⁸⁾
			Varphænur	—	2 400 EXU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 2 400 til 7 400 EXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 30% rúg.	30.9.2001 ^(m)
			Eldiskalkúnar	—	2 400 EXU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 2 400 til 5 600 EXU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 30% rúg.	30.9.2001 ^(m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
10	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1	Efnablanda alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CBS 360.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 45 000 RAU (¹²)/g Vökvaform: 20 000 RAU/ml	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1 800 RAU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 800 RAU. 3. Einvörðungu til nota í fôður-blöndur sem eru ætlaðar fyrir kerfi þar sem fljótandi fôður er gefið og innihalda sterkjuauðug fôðurefni (t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti).	30.9.2001 ⁽⁸⁾
			Eldissvín	—	1 800 RAU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 800 RAU. 3. Einvörðungu til nota í fôður-blöndur sem eru ætlaðar fyrir kerfi þar sem fljótandi fôður er gefið og innihalda sterkjuauðug fôðurefni (t.d. þær sem innihalda yfir 35 % hveiti).	30.9.2001 ⁽⁸⁾
			Gyltur	—	1 800 RAU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 800 RAU. 3. Einvörðungu til nota í fôður-blöndur sem eru ætlaðar fyrir kerfi þar sem fljótandi fôður er gefið og innihalda sterkjuauðug fôðurefni (t.d. þær sem innihalda yfir 35 % hveiti).	30.9.2001 ⁽⁸⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
11	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-glúkanasa, endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 8 000 U (¹³)/ml Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 18 000 U (¹⁴)/ml Endó-1,4-beta-xýlanasi: 26 000 U (¹⁵)/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 400 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 300 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-glúkanasi: 400 til 1 600 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900 til 3 600 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 300 til 5 200 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti eða bygg og 10% rúg.	30.9.2001 ^(g)
12	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-glúkanasa, endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Trichoderma viride</i> (FERM BP-4447), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 8 000 U (¹³)/g Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 18 000 U (¹⁴)/g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 26 000 U (¹⁵)/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 200 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 450 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 650 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-glúkanasi: 800 til 1 200 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 800 til 2 700 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 600 til 3 900 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti og 20% bygg og/eða 25% rúg.	30.9.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis	
					mg/kg heilfóðurs				
			Varphænur	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 640 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-glúkanasi: 640 til 1 280 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 440 til 2 880 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 080 til 4 160 U. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönur og beta-glúkönur), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti og 20% bygg og/eða 25% rúg.	30.9.2001 ^(g)	
					Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 440 U	—			
					Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 080 U	—			
			Eldiskalkúnar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 800 U	—		1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-glúkanasi: 800 til 1 200 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 800 til 2 700 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 600 til 3 900 U. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönur og beta-glúkönur), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti og 20% bygg.	30.9.2001 ^(g**)
					Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 800 U	—			
					Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 600 U	—			

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
13	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúk-anasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94), með virkni að lágmarki: Duftform: 8 000 BGU (¹⁶)/g 11 000 EXU (¹⁷)/g Kornað form: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Vökvaform: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Eldis-kjúklingar	—	100 BGU 130 EXU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 100 BGU 130 EXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 30% bygg eða 20% rúg.	30.9.2001 (^g)
			Varphænur	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 600 BGU 800 EXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti og yfir 30% bygg.	30.9.2001 (^m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Eldiskalkúnar	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 600 BGU 800 EXU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti eða yfir 30% rúg.	30.9.2001 ^(m)
14	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94), með virkni að lágmarki: Fast form: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 600 U ⁽¹⁸⁾ /g Vökvaform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 til 600 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ^(s)
15	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma viride</i> (CBS 517.94), með virkni að lágmarki: Fast form: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 650 U ⁽¹⁹⁾ /g Vökvaform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 325 U/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 325 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 325 til 650 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	30.9.2001 ^(s)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
16	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4	Efnablanda endó-1,4-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 142), með virkni að lágmarki: Fast form: 2 000 CU (²⁰)/g Vökvaform: 2 000 CU/ml	Eldis-kjúklingar	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 (^{g**})
			Varphænur	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 (^{g**})
			Mjólkurgrisir	4 mánuðir	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 (^{g**})

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Eldissvín	—	250 CU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 ^(g**)
17	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: Fast form: 6 000 EPU ⁽²¹⁾ /g Vökvaform: 6 000 EPU/ml	Eldis-kjúklingar	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 1 500 til 3 000 EPU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða maís.	30.9.2001 ^(g**)
			Varphænur	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 1500 til 3 000 CU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða maís.	30.9.2001 ^(g**)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 500 til 3 000 EPU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða maís.	30.9.2001 (^{g**})
			Eldissvín	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 500 til 3 000 EPU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða maís.	30.9.2001 (^{g**})
			Eldiskalkúnar	—	750 EPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 1 500 til 3 000 EPU. 3. Til nota í fóðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti eða maís.	30.9.2001 (ⁿ)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
18	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199), með virkni að lágmarki: Fast form: 2 000 AGL ⁽²²⁾ /g Vökvaform: 500 AGL/ml	Eldis-kjúklingar	—	100 AGL	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 100 AGL. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg og 20% hveiti.	30.9.2001 ^(g)
19	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199), með virkni að lágmarki: Fast form: 1 500 AGL ⁽²²⁾ /g Vökvaform: 200 AGL/g	Eldis-kjúklingar	—	25 AGL	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 25 til 100 AGL. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	30.9.2001 ^(g)
20	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203), með virkni að lágmarki: Fast form: 2 000 AXC ⁽²³⁾ /g Vökvaform: 500 AXC/ml	Eldis-kjúklingar	—	100 AXC	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 100 AXC. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða rúg.	30.9.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
21	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203), með virkni að lágmarki: Fast form: 1 500 AXC ⁽²³⁾ /g Vökvaform: 200 AXC/g	Eldis-kjúklingar	—	25 AXC	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 25 til 100 AXC. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti.	30.9.2001 ⁽⁶⁾
22	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W), með virkni að lágmarki: Fast form: 70 000 BGN ⁽²⁴⁾ /g Vökvaform: 14 000 BGN/ml	Eldis-kjúklingar	—	1 050 BGN	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 2 800 BGN. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	30.9.2001 ⁽⁶⁾
23	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W), með virkni að lágmarki: Fast form: 70 000 IFP ⁽²⁵⁾ /g Vökvaform: 7 000 IFP/ml	Eldis-kjúklingar	—	1 050 IFP	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 1 400 IFP. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 56% hveiti.	30.9.2001 ⁽⁶⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
24	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddir með <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517), með virkni að lágmarki: 28 000 QXU ⁽²⁶⁾ /g 140 000 QGU ⁽²⁷⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 560 QXU 2 800 QGU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 30% bygg.	30.9.2001 ⁽⁸⁾
25	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 100 U ⁽²⁸⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 600 U ⁽²⁹⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 138 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 200 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 138 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 200 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg eða 30% hveiti og 30% maís.	30.9.2001 ⁽⁸⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 138 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 200 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 138 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 200 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg eða 30% hveiti og 30% mais.	30.9.2001 ^(g)
26	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 350 000 BU (³⁰)/g Vökvaform: 50 000 BU/g	Eldis-kjúklingar	—	23 000 BU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 23 000 til 50 000 BU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 20% bygg eða 30% rúg.	30.9.2001 ^(j)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	26 000 BU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur fyrir kílógramm heilföðurs: 26 000 til 35 000 BU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% bygg eða hveiti.	30.9.2001 ^(j)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
27	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94), og endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 200 000 BXU (³¹)/g 200 000 BU (³⁰)/g Vökvaform: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Eldis-kjúklingar	—	2 500 BXU 2 500 BU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 10 000 BXU 10 000 BU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum og glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti eða 30% rúg.	30.9.2001 (¹)
28	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Efnablanda 3-fýtasa, framleiddur með <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 5 000 PPU (³²)/g Vökvaform: 1 000 PPU/g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	250 PPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500 til 750 PPU. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 50% korn (maís, bygg, hveiti), tapiókamjöl, olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 (¹)
			Eldissvín	—	500 PPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500 til 750 PPU. 3. Til nota í fýtataauðugar fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 50% korn (maís, bygg, hveiti), tapiókamjöl, olíufræ og belgjurtir.	30.9.2001 (¹)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
29	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúk-anasa, framleiddur með <i>Geosmithia emersonii</i> (IMI SD 133), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 5 500 U (³³)/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	30.9.2001 ^(b)
30	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýl-anasa, framleiddir með <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101), með virkni að lágmarki: Duftform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2 000 U (³⁴)/g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 400 U (³⁵)/g Vökvaform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 500 U/ml Endó-1,4-beta-xýlanasi: 350 U/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönun og arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg eða 60% hveiti.	30.9.2001 ^(b)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
31	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 614.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 300 EU (³⁶)/g Vökvaform: 1 000 EU/g	Eldis-kjúklingar	—	600 EU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 600 EU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% hveiti.	30.9.2001 ^(b)
			Varphænur	—	300 EU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 600 EU. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% hveiti.	30.9.2001 ^(b)
32	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 200 U (¹⁹)/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% bygg.	30.9.2001 ⁽ⁱ⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
		Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 200 U/ml	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda yfir 55% bygg.	30.9.2001 ⁽¹⁾
			Eldissvín	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 500 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 500 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda yfir 70% bygg.	30.9.2001 ⁽¹⁾
33	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), með virkni að lágmarki: Duftform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 000 U ⁽³⁷⁾ /g Vökvaform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 til 2 500 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 55% hveiti eða 60% rúg.	30.9.2001 ⁽¹⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lámarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Varphænur	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti.	30.9.2001 ⁽¹⁾
	Duftform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U/g Vökvaform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 10 000 U/ml	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 45% hveiti.	30.9.2001 ⁽¹⁾	
	Duftform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U/g Vökvaform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 8 000 U/ml	Eldissvín	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% hveiti.	30.9.2001 ⁽¹⁾	

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
34	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó 1,4-beta-xýlanasa, framleiddir með <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541), og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (ATCC 66222), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 275 U ⁽²⁸⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U ⁽³⁸⁾ /g Alfa-amýlasi: 3 100 U ⁽³⁹⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 165 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 240 U Alfa-amýlasi: 1 860 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 165 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 240 U alfa-amýlasi: 1 860 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 45% bygg og 10% hveiti eða 10% maís.	30.9.2001 ^(k)
35	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 80 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 180 U ⁽³⁷⁾ /g	Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 80 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 180 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 80 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 180 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönnum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 60% bygg.	30.9.2001 ^(k)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
36	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-xýlanasa framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 300 U ⁽¹⁹⁾ /g endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U ⁽³⁷⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 300 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 300 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönun og arabinoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40 % bygg.	30.9.2001 ^(k)
			Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 300 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 300 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönun og arabinoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% bygg.	30.9.2001 ^(k)
37	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Súbtílisín EC 3.4.21.62	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), og súbtílisíns framleitt með <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 500 U ⁽³⁷⁾ /g Súbtílisín: 800 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 U Súbtílisín: 160 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 til 2 500 U súbtílisín: 160 til 800 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 65% hveiti.	30.9.2001 ^(k)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Kalkúnar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 825 U Súbtílisín: 265 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 825 til 2 500 U súbtílisín: 265 til 800 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 45% hveiti.	30.9.2001 ^(k)
38	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Súbtílisín EC 3.4.21.62	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), og súbtílisíns framleitt með <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U ⁽³⁷⁾ /g Súbtílisín: 500 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U Súbtílisín: 500 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 5 000 U súbtílisín: 500 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2001 ^(k)
39	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U ⁽³⁷⁾ /g	Eldissvín	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönunum og arabínoxýlönunum), t.d. þær sem innihalda yfir 65 % bygg.	30.9.2001 ^(k)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
40	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Súbtílisín EC 3.4.21.62	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúk-anasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), og súbtílisíns, framleitt með <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U (¹⁹)/g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U (³⁷)/g Súbtílisín: 800 U (⁴⁰)/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 30 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 90 U Súbtílisín: 240 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 30 til 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 90 til 300 U súbtílisín: 240 til 800 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 60% bygg.	30.9.2001 ^(k)
41	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Súbtílisín EC 3.4.21.62	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúk-anasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), og súbtílisíns, framleitt með <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U (¹⁹)/g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 500 U (³⁷)/g Súbtílisín: 800 U (⁴⁰)/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 25 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 625 U Súbtílisín: 200 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 25 til 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 625 til 2 500 U súbtílisín: 200 til 800 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 10% bygg.	30.9.2001 ^(k)
			Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 500 U Súbtílisín: 800 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 2 500 U súbtílisín: 800 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, t.d. þær sem innihalda yfir 50% hveiti og 25% bygg.	30.9.2001 ^(k)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
42	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), með virkni að lágmarki: Fast form: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U ⁽³⁷⁾ /g Eiginleikar leyfðu efnablöndunnar: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1,99% Hveiti: 97,7% Kalsíumprópíonat: 0,3% Lesítín: 0,01%	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 60% hveiti.	30.9.2001 ^(k)
		Eldissvín	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönun), t.d. þær sem innihalda yfir 60% hveiti.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾	
43	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 3 975 U ⁽³⁷⁾ /g Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 125 U ⁽¹⁹⁾ /g Alfa-amýlasi: 1 000 U ⁽⁴¹⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 3 975 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 125 U Alfa-amýlasi: 1 000 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 3 975 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 125 U alfa-amýlasi: 1 000. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönun og beta-glúkönun), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti og 20% bygg og 20% rúg.	30.9.2001 ^(l)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
44	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U ⁽³⁷⁾ /g Alfa-amýlasi: 1 000 U ⁽⁴¹⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U alfa-amýlasi: 1 000 U. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 50% bygg.	30.9.2001 ⁽¹⁾
	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8				Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U	—		
	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1				Alfa-amýlasi: 1 000 U	—		
45	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U ⁽³⁷⁾ /g Alfa-amýlasi: 1 000 U ⁽⁴¹⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við köggulun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U alfa-amýlasi: 1 000. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 35% bygg.	30.9.2001 ⁽¹⁾
	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8				Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U	—		
	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1				Alfa-amýlasi: 1 000 U	—		

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
46	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Fjölgalaktúronasi EC 3.2.1.15	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), og fjölgalaktúronasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U ⁽³⁷⁾ /g Fjölgalaktúronasi: 50 U ⁽⁴¹⁾ /g	Eldissvín	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U Fjölgalaktúronasi: 50 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 400 U fjölgalaktúronasi: 50 U. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 ⁽¹⁾
47	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Fjölgalaktúronasi EC 3.2.1.15	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), fjölgalaktúronasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) með virkni að lágmarki: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U ⁽¹⁹⁾ /g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U ⁽³⁷⁾ /g Alfa-amýlasi: 1 000 U ⁽⁴¹⁾ /g Fjölgalaktúronasi: 25 U ⁽⁴²⁾ /g	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U Alfa-amýlasi: 1 000 U Fjölgalaktúronasi: 25 U	— — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 4 000 U fjölgalaktúronasi: 25 U. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda korn sem er auðugt af sterkju og öðrum fjölsykrum (einkum arabínoxýlönnum og beta-glúkönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 20% bygg og 35% hveiti.	30.9.2001 ⁽¹⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
48	Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda alfa-amýlasa og endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddir með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: Alfa-amýlasi: 200 KNU ⁽⁴³⁾ /g Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 350 FBG ⁽⁴⁴⁾ /g Vökvaform: Alfa-amýlasi: 130 KNU/ml Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 225 FBG/ml	Eldis-kjúklingar	—	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 20 KNU 35 FBG. 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 ^(m)
			Eldiskalkúnar	—	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 40 KNU 70 FBG. 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% bygg.	30.9.2001 ^(m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
49	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amýlasa, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), basillólýsíns, framleitt með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554), og fjölgalakturnónasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) með virkni að lágmarki:	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U alfa-amýlasi: 500 basillólýsín: 800 U fjölgalakturnónasi: 50 U. 3. Til nota í fôðurböndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum og arabinoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8				Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U	—		
	Alfa-amýlasi: EC 3.2.1.1				Alfa-amýlasi: 500 U	—		
	Basillólýsín EC EC 3.4.24.28				Basillólýsín 800 U	—		
	Fjölgalakturnónasi EC 3.2.1.15				Fjölgalakturnónasi: 50 U	—		
		Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U ⁽¹⁹⁾ /g	Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U alfa-amýlasi: 500 basillólýsín: 800 U fjölgalakturnónasi: 50 U. 3. Til nota í fôðurböndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkónum og arabinoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 30% hveiti.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U ⁽³⁷⁾ /g	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1 500 U			—			
	Alfa-amýlasi: 500 U ⁽⁴¹⁾ /g	Alfa-amýlasi: 500 U			—			
	Basillólýsín: 800 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Basillólýsín: 800 U			—			
		Fjölgalakturnónasi: 50 U ⁽⁴²⁾ /g			Fjölgalakturnónasi: 50 U	—		

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
50	6-fýtasi EC 3.1.3.26	Efnablanda 6-fýtasa, framleiddur með <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857), með virkni að lágmarki: Hjúpað form: 2 500 FYT (³)/g Vökvaform: 5 000 FYT/g	Eldiskjúklingar	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 FYT. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
			Varphænur	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 FYT. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
			Eldiskalkúnar	—	250 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 FYT. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
			Mjólkurgrísir	2 mánuðir	500 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 FYT. 3. Til nota í fôðurlöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Eldissvín	—	500 FYT	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 500 til 1 000 FYT. 3. Til nota í fôðurblöndur sem innihalda yfir 0,25% fýtinbundinn fosfór.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
51	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 15136), með virkni að lágmarki: 100 IU ⁽⁴⁵⁾ /g	Eldis-kjúklingar	—	10 IU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: 10 IU. 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾
52	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amýlasi: EC 3.2.1.1	Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), og alfa-amýlasi, framleiddur með <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), með virkni að lágmarki: Vökvaform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 10 000 U ⁽⁴⁶⁾ /ml Endó-1,4-beta-glúkanasi: 120 000 U ⁽⁴⁷⁾ /ml Alfa-amýlasi: 400 U ⁽⁴⁸⁾ /ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000 U Endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000 U Alfa-amýlasi: 40 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilföðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 1 000 til 2 000 U endó-1,4-beta-glúkanasi: 12 000 til 24 000 U alfa-amýlasi: 40 til 80 U. 3. Til nota í fôðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum betaglúkönnum og arabínoxýlönnum), t.d. þær sem innihalda yfir 20% hveiti, 15% dúrru og 5% maís.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
Örverur								
1	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> NCIMB 40112/ CNCM I-1012	Efnablanda <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> sem inniheldur að lágmarki 1×10^{10} CFU/g aukefnis	Eldis- kjúklingar	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hnislalyf: mónensínnatríum, lasólasiðnatríum, salínómýsinnatríum, amprólíumetópabat, metíklórpindól-metýlbensókat, dekokínat, róbenídín, narasín, halófúgínón.	20.2.2001 ⁽¹⁾
			Varphænur	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	20.2.2001 ⁽¹⁾
			Kálfar	6 mánuðir	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun	20.2.2001 ⁽¹⁾
			Eldis- nautgripir	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> í dagskammti skal ekki fara yfir $1,0 \times 10^9$ CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. $0,2 \times 10^9$ CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	20.2.2001 ⁽¹⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
3			Dádýr til undaneldis	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hið leyfða hníslalyf: róbenidín.	20.2.2001 ⁽¹⁾
			Eldiskánínur	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: metíklórpindól, róbenidín, salínómýsínatríum.	20.2.2001 ⁽¹⁾
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47	Efnablanda <i>Saccharomyces cerevisiae</i> sem inniheldur að lágmarki 5×10^9 CFU/g aukefnis	Eldis-nautgripir	—	4×10^9	8×10^9	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn <i>Saccharomyces cerevisiae</i> í dagskammti skal ekki fara yfir $2,5 \times 10^{10}$ CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. $0,5 \times 10^{10}$ CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.“	20.2.2001 ^(b)
			Eldiskánínur	—	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hið leyfða hníslalyf: metíklórpindól.	30.9.2001 ^(e)
			Gyltur	—	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(e)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	5×10^9	1×10^{10}	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(e)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
4	<i>Bacillus cereus</i> ATCC 14893	Efnablanda <i>Bacillus cereus</i> sem inniheldur að lágmarki 10 ¹⁰ CFU/g aukefnis	Eldiskaniður	—	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	—	20.2.2001 ^(b)
			Kanínur til undaneldis	—	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	—	20.2.2001 ^(b)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	5 × 10 ⁸	1 × 10 ¹⁰	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	20.2.2001 ^(g)
			Eldissvín	—	2 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	20.2.2001 ^(g)
			Gyltur	15 daga fyrir got og á mjólkurskeiði	8,5 × 10 ⁸	1,2 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	20.2.2001 ^(g)
			Kálfar	16 vikur	1 × 10 ⁹	1,2 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	20.2.2001 ^(g)
			Eldis-kjúklingar	—	2 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í föðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, halófúgínón, lasalósíðnatríum, madúramísínammóníum, mónensínnatríum, narasín, salínómýsinnatríum, metíklórpíndól, díklasúríl.	20.2.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
			Eldiskalkúnar	26 vikur	2×10^8	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, halófúgínón, metíklórþindól/metýl-bensókat, díklasúríl, nífúrsól.	20.2.2001 ^(g)
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Efnablanda Saccharomyces cerevisiae sem inniheldur að lágmarki: 1×10^8 CFU/g aukefnis	Kálfar	6 mánuðir	2×10^8	2×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(g)
			Eldis-nautgripir	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn Saccharomyces cerevisiae í dagskammti skal ekki fara yfir $7,5 \times 10^8$ CFU á hver 100 kg af líkamsþyngd. 1×10^8 CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	30.9.2001 ^(h)
6	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Efnablanda Saccharomyces cerevisiae sem inniheldur að lágmarki: 2×10^{10} CFU/g aukefnis	Gyltur	—	2×10^9	1×10^{10}	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(g)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	6×10^9	3×10^{10}	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(g)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Efnablanda Saccharomyces cerevisiae sem inniheldur að lágmarki: 2 × 10 ¹⁰ CFU/g aukefnis	Mjólkurkýr	—	5,5 × 10 ⁸	2,1 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn Saccharomyces cerevisiae í dagskammti skal ekki fara yfir 8,4 × 10 ⁹ CFU á hver 100 kg af líkamsþyngd. 1,8 × 10 ⁹ CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	30.9.2001 ⁽⁸⁾
			Eldis-nautgripir	—	1 × 10 ⁹	1,5 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn Saccharomyces cerevisiae í dagskammti skal ekki fara yfir 4,6 × 10 ⁹ CFU á hver 100 kg af líkamsþyngd. 2 × 10 ⁹ CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	30.9.2001 ⁽⁸⁾
8	Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 [Í hlutfallinu 1/1]	Blanda hjúpaðrar Enterococcus faecium ATCC 53519 og hjúpaðrar Enterococcus faecium AACC 55593 með lágmarksaukefnisinnihald 2 × 10 ⁸ CFU/g (þ.e. að lágmarki 1 × 10 ⁸ CFU/g af hvorri bakteríu)	Eldis-kjúklingar	—	1 × 10 ⁸	1 × 10 ⁸	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurböndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, dekókinat, halófúgínón, lasalósíðnatríum, madúramísínammóníum, mónensínnatríum, narasín, níkarbasín, narasín/níkarbasín, salínómýsín-natríum.	30.9.2001 ⁽⁸⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
9	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Efnablanda <i>Pediococcus acidilactici</i> með lágmarksaukefnisinnihald 1×10^{10} CFU/g	Eldis-kjúklingar	—	1×10^9	1×10^{10}	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, metíklórpindól, dekókinat, halófúgínón, narsín, salínómýsínatríum, níkarbasín, madúramísínammóníum, díklasúríl.	30.9.2001 ^(b)
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1×10^9	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(b)
			Eldissvín	—	1×10^9	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(b)
10	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: Örhylkjað form: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g aukefnis $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g aukefnis	Eldis-kjúklingar	—	$0,3 \times 10^9$	$2,8 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, amprólíum/etópabat, díklasúríl, halófúgínón, madúramísínammóníum, metíklórpindól, metíklórpindól/metýlbensókat, mónensínatríum, róbenídín, salínómýsínatríum.	30.9.2001 ^(b)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
			Eldissvín	—	$0,35 \times 10^9$	$1,5 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(b)
			Gyltur	—	$0,2 \times 10^9$	$1,25 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(b)
			Eldis-nautgripir	—	$0,25 \times 10^9$	$0,6 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn <i>Enterococcus faecium</i> í dagskammti skal ekki fara yfir 1×10^9 CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. 1×10^9 CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	30.9.2001 ^(b)
		Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: örhылkjað form: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g aukefnis $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g aukefnis og kornað form: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	$0,3 \times 10^9$	$1,4 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Kornað form er einungis til nota í staðgöngumjólk.	30.9.2001 ^(b)
			Kálfar	6 mánuðir	$0,35 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Kornað form er einungis til nota í staðgöngumjólk.	30.9.2001 ^(b)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
11	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: 5×10^{10} CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(b)
			Eldis-kjúklingar	—	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, díklasúríl, halófúgínón, mónensín-natríum, metíklórpindól, metýlbensókat, níkarbasín.	30.9.2001 ^(m)
			Kálfar	4 mánuðir	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(m)
12	<i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67/4R	Efnablanda <i>Lactobacillus farciminis</i> sem inniheldur að lágmarki 1×10^9 CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1×10^9	1×10^{10}	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽ⁱ⁾

Nr. (eða EB-nr)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
13	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/ NCIMB 10415	Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: duft og kornað form: 3,5 × 10 ¹⁰ CFU/g aukefnis hjúpað form: 2,0 × 10 ¹⁰ CFU/g aukefnis vökvaform: 1 × 10 ¹⁰ CFU/ml aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
			Kálfar	6 mánuðir	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun	30.9.2001 ^(k)
			Eldis- kjúklingar	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Má nota í fôðurlöndur sem innihalda hin leyfðu hníslalyf: amprólíum, amprólíum/etópabat, dekókinat, díklasúríl, halófúgínón, lasalósíðnatríum, madúr-amísínammóníum, metíklórpínd-ól/metýlbensókat, mónensínnatríum, narsín, níkarbasín, salínómýsín-natríum	30.9.2001 ^(k)
14	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	Efnablanda <i>Saccharomyces cerevisiae</i> sem inniheldur að lágmarki: Duft, kúlu- og egglega korn: 1 × 10 ⁹ CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	3 × 10 ⁹	3 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
			Eldis- nautgripir	—	9 × 10 ⁹	9 × 10 ⁹	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn <i>Saccharomyces cerevisiae</i> í dag-skammti skal ekki fara yfir 1,6 × 10 ¹⁰ CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. 3,2 × 10 ⁹ CFU er bætt við á hver 100 kg líkamsþyngdar umfram.	30.9.2001 ⁽¹⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
15	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: Duftform: 4×10^{11} CFU/g aukefnis Hjúpað form: 5×10^{10} CFU/g aukefnis	Kálfar	6 mánuðir	5×10^8	2×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	5×10^8	2×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
16	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 7133	Blanda: <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur 7×10^9 CFU/g að lágmarki og <i>Lactobacillus rhamnosus</i> sem inniheldur 3×10^9 CFU/g að lágmarki	Kálfar	6 mánuðir	1×10^9	6×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
			Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1×10^9	5×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽¹⁾
17	<i>Lactobacillus casei</i> NCIMB 30096 <i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30098	Blanda <i>Lactobacillus casei</i> og <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki: <i>Lactobacillus casei</i> 2×10^9 CFU/g og <i>Enterococcus faecium</i> 6×10^9 CFU/g	Kálfar	6 mánuðir	<i>Lactobacillus casei</i> $0,5 \times 10^9$ <i>Enterococcus faecium</i> $1,5 \times 10^9$	<i>Lactobacillus casei</i> 1×10^9 <i>Enterococcus faecium</i> 3×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(m)
18	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515	Efnablanda <i>Enterococcus faecium</i> sem inniheldur að lágmarki 1×10^{10} CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	1×10^9	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(m)
			Kálfar	6 mánuðir	1×10^9	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ^(m)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					CFU/kg heilföðurs			
19	<i>Streptococcus infantarius</i> CNCM I-841 <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-840	Blanda: <i>Streptococcus infantarius</i> og <i>Lactobacillus plantarum</i> sem inniheldur að lágmarki: <i>Streptococcus infantarius</i> $0,5 \times 10^9$ CFU/g og <i>Lactobacillus plantarum</i> 2×10^9 CFU/g	Kálfar	6 mánuðir	<i>Streptococcus infantarius</i> 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> $0,5 \times 10^9$	<i>Streptococcus infantarius</i> 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> $0,5 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.	30.9.2001 ⁽ⁿ⁾

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			

Bindiefni geislavirkra kjarnategunda

1. Bindiefni geislavirks sesíums (^{137}Cs og ^{134}Cs)

1.1	Járn(III)ammoníumhexasýanóferrat(II)	$\text{NH}_4\text{Fe(III)[Fe(II)(CN)}_6]$	Jórturdýr (húsdýr og villt dýr)	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn járn(III)ammoníumhexasýanóferrats(II) í dagskammti skal vera á bilinu 10 til 150 mg á hver 10 kg af líkamsþyngd.“	13.10.2001 ^(c)
			Kálfar áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn járn(III)ammoníumhexasýanóferrats(II) í dagskammti skal vera á bilinu 10 til 150 mg á hver 10 kg af líkamsþyngd.“	13.10.2001 ^(c)

Nr. (eða EB-nr.)	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilföðurs			
			Lömb áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn járn(III)ammoníumhexasýanó- ferrats(II) í dagskammti skal vera á bilinu 10 til 150 mg á hver 10 kg af líkamsþyngd.“	13.10.2001 ^(c)
			Kiðlingar áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn járn(III)ammoníumhexasýanó- ferrats(II) í dagskammti skal vera á bilinu 10 til 150 mg á hver 10 kg af líkamsþyngd.“	13.10.2001 ^(c)
			Svín (húsdýr og villt dýr)	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Magn járn(III)ammoníumhexasýanó- ferrats(II) í dagskammti skal vera á bilinu 10 til 150 mg á hver 10 kg af líkamsþyngd.“	13.10.2001 ^(c)

^(a) Fyrsta leyfisveiting: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/72/EB (Stjtið. EB L 351, 23.12. 1997, bls. 55).

^(b) Fyrsta leyfisveiting: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/7/EB (Stjtið. EB L 51, 1.3.1996, bls. 45).

^(c) Fyrsta leyfisveiting: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/66/EB (Stjtið. EB L 272, 25.10.1996, bls. 32).

^(d) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2316/98 (Stjtið. EB L 289, 28.10.1998, bls. 4).

^(e) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 639/1999 (Stjtið. EB L 82, 26.3.1999, bls. 6).

^(f) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1245/1999 (Stjtið. EB L 150, 17.6.1999, bls. 15).

^(g) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1436/98 (Stjtið. EB L 191, 7.7.1998, bls. 15).

^(g*) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1436/98 (Stjtið. EB L 191, 7.7.1998, bls. 15) með breytingum á formi/styrk í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 654/2000 (Stjtið. EB L 79, 30.3.2000, bls. 26).

^(g**) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1436/98 (Stjtið. EB L 191, 7.7.1998, bls. 15) með breytingum á skilyrðum um notkun í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000 (Stjtið. EB L 155, 28.6.2000, bls. 15).

^(h) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 866/1999 (Stjtið. EB L 108, 27.4.1999, bls. 21).

^(h*) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 866/1999 (Stjtið. EB L 108, 27.4.1999, bls. 21) með breytingum á styrk í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 654/2000 (Stjtið. EB L 79, 30.3.2000, bls. 26).

⁽ⁱ⁾ Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1411/1999 (Stjtið. EB L 164, 30.6.1999, bls. 56).

^(j) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2374/98 (Stjtið. EB L 295, 4.11.1998, bls. 3).

^(k) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1636/1999 (Stjtið. EB L 194, 27.7.1999, bls. 17).

^(l) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2690/1999 (Stjtið. EB L 326, 18.12.1999, bls. 33).

^(m) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 654/2000 (Stjtið. EB L 79, 30.3.2000, bls. 26).

⁽ⁿ⁾ Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000 (Stjtið. EB L 155, 28.6.2000, bls. 15).

^(o) Fyrsta leyfisveiting: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1887/2000 (Stjtið. EB L 227, 7.9.2000, bls. 13).

⁽¹⁾ Ef nákvæmt hámarksmagn hefur ekki verið ákvarðað, og þess er byggt á fullnægjandi gögnum um tilvist díoxíns skal hámarksmagnið 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg gilda frá 15. október 2000.

⁽²⁾ 1 FTU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,5 og 37 °C.

⁽³⁾ 1 FYT er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,5 og 37 °C.

⁽⁴⁾ 1 GALU er magn þess ensíms sem klýfur 1 mikrómol p-nítrófenýl-alfa-galaktopýranósíðs með vatnsrofi á mínútu við pH 5,0 og 30 °C.

⁽⁵⁾ 1 FBG er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.

⁽⁶⁾ 1 FXU er magn þess ensíms sem leysir 7,8 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr arabínóxýlani úr asó-hveiti við pH 6,0 og 50 °C.

⁽⁷⁾ 1 FXU er magn þess ensíms sem leysir 3,1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr arabínóxýlani úr asó-hveiti við pH 6,0 og 50 °C.

⁽⁸⁾ 1 FBG er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 6,0 og 50 °C.

⁽⁹⁾ 1 FXU er magn þess ensíms sem leysir 0,15 mikrómol xýlósa á mínútu úr asúrín-víxl tengdu xýlani við pH 5,0 og 40 °C.

- ⁽¹⁰⁾ 1 BGU er magn þess ensíms sem leysir 0,15 mikrómol glúkósa á mínútu úr asúrín-víxlengdu beta-glúkani við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽¹¹⁾ 1 EXU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr arabínoxýlani við pH 3,5 og 55 °C.
- ⁽¹²⁾ 1 RAU er magn þess ensíms sem ummyndar 1 mg leysanlegrar sterkju í afurð, sem hefur sömu gleypni og viðmiðunarlitur við 620 nm eftir efnahvörf með joði, á mínútu við pH 6,6 og 30 °C.
- ⁽¹³⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr karboxýmetýlsellulósa við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽¹⁴⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽¹⁵⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 mikrómol glúkósa á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽¹⁶⁾ 1 BGU er magn þess ensíms sem leysir 0,278 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 3,5 og 40 °C.
- ⁽¹⁷⁾ 1 EXU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr arabínoxýlani úr hveiti við pH 3,5 og 55 °C.
- ⁽¹⁸⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol xýlósa úr xýlani úr birkiviði við pH 5,3 og 50 °C.
- ⁽¹⁹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.
- ⁽²⁰⁾ 1 CU er magn þess ensíms sem leysir 0,128 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,5 og 30 °C.
- ⁽²¹⁾ 1 EPU er magn þess ensíms sem leysir 0,0083 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 4,7 og 30 °C.
- ⁽²²⁾ 1 AGL er magn þess ensíms sem leysir 5,55 mikrómol afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,6 og 30 °C.
- ⁽²³⁾ 1 AXC er magn þess ensíms sem leysir 17,2 mikrómol afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,7 og 30 °C.
- ⁽²⁴⁾ 1 BGN er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,8 og 50 °C.
- ⁽²⁵⁾ 1 IFP er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,8 og 50 °C.
- ⁽²⁶⁾ 1 QXU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 5,1 og 50 °C.
- ⁽²⁷⁾ 1 QGU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,8 og 50 °C.
- ⁽²⁸⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr höfrum við pH 4,0 og 30 °C.
- ⁽²⁹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,0 og 30 °C.
- ⁽³⁰⁾ 1 BU er magn þess ensíms sem leysir 0,06 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,8 og 50 °C.
- ⁽³¹⁾ 1 BXU er magn þess ensíms sem leysir 0,06 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birki við pH 5,3 og 50 °C.
- ⁽³²⁾ 1 PPU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5 og 37 °C.
- ⁽³³⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 2,78 mikrómol afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 50 °C.
- ⁽³⁴⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 5,55 mikrómol afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 50 °C.
- ⁽³⁵⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 4,00 mikrómol afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birkiviði við pH 5,5 og 50 °C.
- ⁽³⁶⁾ 1 EU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,5 og 40 °C.
- ⁽³⁷⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,3 og 50 °C.
- ⁽³⁸⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,0 og 30 °C.
- ⁽³⁹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr hveitisterkju við pH 4,0 og 30 °C.
- ⁽⁴⁰⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrógramm fenólsambands (týrósinjafngilda) á mínútu úr kaseíni við pH 7,5 og 40 °C.
- ⁽⁴¹⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol glúkósiðtenginga á mínútu úr vatnsóleysanlegu, víxltengdu sterkjuþjölliðuhvarfefni við pH 6,5 og 37 °C.
- ⁽⁴²⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi efnis (galaktúrónsýrujafngilda) á mínútu úr fjöl-D-galaktúrónhvarfefni við pH 5,0 og 40 °C.
- ⁽⁴³⁾ 1 KNU er magn þess ensíms sem leysir 672 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr leysanlegri sterkju við pH 5,6 og 37 °C.
- ⁽⁴⁴⁾ 1 FBG er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.
- ⁽⁴⁵⁾ 1 IU er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birkiviði við pH 4,5 og 30 °C.
- ⁽⁴⁶⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 7,5 og 30 °C.
- ⁽⁴⁷⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,0056 mikrómol afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr karboxýmetýlbeðmi við pH 4,8 og 50 °C.
- ⁽⁴⁸⁾ 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 mikrómol af glúkósa á mínútu úr víxltengdum sterkjuþjölliðum við pH 7,5 og 37 °C.